

# ด่วนที่สุด

ที่ รย ๐๐๒๓.๖/ว ๕๖๕๑



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
สำนักงานเทศบาลนครระยอง สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด และสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง

ด้วยจังหวัดระยองได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ว่าจังหวัดระยองพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๔๑๒ ราย ผู้ป่วยไข้เลือดออกเฉลี่ย ๑๐ - ๑๕ รายต่อวัน ผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน ๕ ราย อายุของผู้ป่วยเสียชีวิตเฉลี่ย ๑๕ - ๓๕ ปี มีน้ำหนักมากจากการสอบสวนโรคพบว่า

๑.ผู้ป่วยเสียชีวิตเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังจากมีไข้ไปแล้ว ๓ - ๕ วัน ดังนั้น หากมีไข้หรือเจ็บป่วยใดๆ และรับประทานยาไปแล้ว ๑ - ๒ วัน อาการไม่ดีขึ้นหรือไม่ทุเลาแนะนำให้ตรวจรักษาที่โรงพยาบาล

๒.ผู้ป่วยเสียชีวิตมีประวัติไปรักษาพยาบาลหลายแห่งทั้งโรงพยาบาลและคลินิก ดังนั้น หากมีไข้หรือเจ็บป่วยใดๆ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้ไปยังโรงพยาบาลหรือคลินิกเดิม เพื่อให้แพทย์พิจารณาอาการและรักษาตามการติดเชื้อและเป็นโรค

๓.ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือญาติซื้อยามารับประทานเองและพบว่าเป็นยาชุด จากร้านขายของชำหรือรถเร่ ซึ่งยาที่ซื้อมารับประทานเอง พบเป็นยาลายกล้ำเนื้อ/ลดอาการปวดข้อ ยาแก้ปวดชนิดรุนแรงที่มีผลทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่าย และยาอื่น ๆ ที่มีผลทำให้เส้นเลือดประและแตกง่าย ดังนั้น หากมีไข้หรือเจ็บป่วยใดๆ ไม่ควรรับประทานยาชุด ขอให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนการรับประทานยาทุกครั้งและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

๔.ผู้ป่วยเสียชีวิตและญาติเข้าใจว่าการรับประทานยาที่ซื้อมาเองดีขึ้น มีผลทำให้ตนเองหายหรือทุเลาจากโรค จึงขาดความตระหนักถึงภาวะอันตรายและการก่อความรุนแรงของเชื้อไวรัสโรคไข้เลือดออกที่มีการติดเชื้อมาก่อน ดังนั้น หากรับประทานยาไม่ดีขึ้นในระยะ ๑-๒ วัน แนะนำให้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล

๕.บ้านผู้ป่วยเสียชีวิตผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ยังพบลูกน้ำยุงลายจำนวนมากทั้งในบ้านและรอบบ้าน ตามภาชนะที่มีน้ำขัง ทั้งภาชนะที่ใช้งานและไม่ใช้งานในบ้านและรอบๆ บ้านของผู้ป่วยเสียชีวิตและเพื่อนบ้าน ดังนั้น ขอให้บ้านทุกหลังคาเรือนดำเนินการทำลายภาชนะที่ไม่ใช้แล้วให้หมด ส่วนภาชนะที่ยังใช้อยู่อย่าให้มีน้ำขังที่ยุงจะสามารถวางไข่และเพาะพันธุ์ได้

๖.บ้านผู้ป่วยเสียชีวิตพบว่ามีกระบายอากาศไม่ดี มีดทับ อับ ซีน การเก็บของในบ้านไม่เป็นสัดส่วน/ระเบียบ รก ซึ่งยุงลายมักจะพักอาศัยบริเวณที่มีดทับ ดังนั้น ขอให้จัดบ้านให้เป็นระเบียบ เพิ่มการระบายอากาศ แดดส่องถึง และหมั่นทำความสะอาดเสมอๆ ส่วนรอบๆ บ้านขอให้กำจัดวัชพืชที่ไม่มีประโยชน์ออกไม่ดอกไม่ประดับ พืชประดับไม้เลื้อยที่เลื้อยไว้วางยามอย่าให้มีน้ำขังในภาชนะหรือพืชที่ปลูกไว้ เช่น สับปะรดสีหรือพืชที่มีกาบใบต่างๆ

/๗. หากมีการ...

๗.หากมีการรณรงค์พ่นสารเคมี สํารวจ/ทำลายลูกน้ำยุงลายในการควบคุมโรคไข้เลือดออก หรือการสอบสวนโรค ขอความร่วมมือจากผู้ป่วยและญาติในการรณรงค์ฯ และสอบสวนโรคด้วย

ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ทราบ สำหรับข้อมูลด้านโรคไข้เลือดออกหรือโรคติดต่ออื่นๆ ที่สำคัญ หรือสถานการณ์โรคอื่นๆ สามารถค้นหา ข้อมูลได้ที่ Web site ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขหรือกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดระยอง สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย ๐๐๓๓/ว ๕๗๔๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ส่งมาพร้อมนี้ และสามารถ ดาวน์โหลดได้ทาง [www.rayonglocal.go.th](http://www.rayonglocal.go.th)



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น

และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร.๐๓๘-๖๕๔-๑๕๑-๒ ต่อ ๒๐,๒๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [saraban\\_ryg@dla.go.th](mailto:saraban_ryg@dla.go.th)

ผู้ประสานงาน นางสาวภรณ์พรรณ ยุระเทศ

# ด่วนที่สุด

ที่ รย ๐๐๓๓/ว๕๗๕๕



|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| สจ. ระบอง                     | ๗๕๗๕         |
| เลขรับ                        | ๗๕๗๕         |
| วันที่                        | ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖ |
| สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระบอง |              |
| ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๐๐๐          |              |

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดระบอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดระบอง

จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย จังหวัดระบอง พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๔๑๒ ราย ผู้ป่วยไข้เลือดออกเฉลี่ย ๑๐-๑๕ รายต่อวัน ผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน ๕ ราย อายุของผู้ป่วยเสียชีวิตเฉลี่ย ๑๕-๓๕ ปี มีน้ำหนักมาก จากการสอบสวนโรคพบว่า

๑.) ผู้ป่วยเสียชีวิตเข้ารับการรักษารักษาในโรงพยาบาลหลังจากมีไข้ไปแล้ว ๓-๕ วัน ดังนั้นหากมีไข้หรือเจ็บป่วยใดๆ และรับประทานยาไปแล้ว ๑-๒ วัน อาการไม่ดีขึ้นหรือไม่ทุเลาแนะนำให้ไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล

๒.) ผู้ป่วยเสียชีวิตมีประวัติไปรักษาพยาบาลหลายแห่งทั้งโรงพยาบาลและคลินิก ดังนั้นหากมีไข้หรือเจ็บป่วยใดๆ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้ไปยังโรงพยาบาลหรือคลินิกเดิม เพื่อให้แพทย์พิจารณาอาการ และรักษาตามการติดเชื้อและเป็นโรค

๓.) ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือญาติซื้อยามารับประทานเองและพบว่าเป็นยาชุด จากร้านขายของชำหรือรถเร่ ซึ่งยาที่ซื้อมารับประทานเอง พบเป็นยาลดกรด/ลดอาการปวดข้อ ยาแก้ปวดชนิดรุนแรงที่มีผลทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่าย และยาอื่นๆ ที่มีผลทำให้เส้นเลือดเปราะและแตกง่าย ดังนั้นหากมีไข้หรือเจ็บป่วยใดๆ ไม่ควรรับประทานยาชุด ขอให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนการรับประทานยาทุกครั้งและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

๔.) ผู้ป่วยเสียชีวิตและญาติเข้าใจว่าการรับประทานยาที่ซื้อเองดีขึ้น มีผลทำให้ตนเองหายหรือทุเลาจากโรค จึงขาดความตระหนักถึงภาวะอันตรายและการก่อความรุนแรงของเชื้อไวรัสโรคไข้เลือดออกที่มีการติดเชื้อมาก่อน ดังนั้นหากรับประทานยาไม่ดีขึ้นในระยะ ๑-๒ วันแนะนำให้ไปปรับการรักษาที่โรงพยาบาล

๕.) บ้านผู้ป่วยเสียชีวิตผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ยังพบลูกน้ำยุงลายจำนวนมากทั้งในบ้านและรอบบ้าน ตามภาชนะที่มีน้ำขัง ทั้งภาชนะที่ใช้งานและไม่ใช้งานในบ้านและรอบๆ บ้านของผู้ป่วยเสียชีวิตและเพื่อนบ้าน ดังนั้นขอให้บ้านทุกหลังคาเรือนดำเนินการทำลายภาชนะที่ไม่ใช้แล้วให้หมด ส่วนภาชนะที่ยังใช้อ้อยู่อย่าให้มีน้ำขังที่ยุงจะสามารถวางไข่และเพาะพันธุ์ได้

๖.) บ้านผู้ป่วยเสียชีวิตพบว่ามีกระบายอากาศไม่ดี มีดทับ อับชื้น การเก็บของในบ้านไม่เป็นสัดส่วน/ระเบียบ รก ซึ่งยุงลายมักจะพักอาศัยบริเวณที่มีดทับ ดังนั้นขอให้จัดบ้านให้เป็นระเบียบ เพิ่มการระบายอากาศ แดดส่องถึง และมันทำความสะอาดเสมอๆ ส่วนรอบๆ บ้านขอให้กำจัดวัชพืชที่ไม่มีประโยชน์ออกไม่ดอกไม่ประดับ พืชประดับไม้เลื้อยที่เลื้อยไว้วางยามอย่าให้มีน้ำขังในภาชนะหรือพืชที่ปลูกไว้ เช่น สับปะรดสีหรือพืชที่มีกาบใบต่างๆ

๗.) หากมีการ...//

๗.) หากมีการรณรงค์พ่นสารเคมีสำรวจ/ทำลายลูกน้ำยุงลายในการควบคุมโรคไข้เลือดออก หรือการสอบสวนโรค ขอความร่วมมือจากผู้ป่วยและญาติในการรณรงค์ฯ และสอบสวนโรคด้วย

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่าน แจ้งหน่วยงานสังกัด และประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้หากประชาชนต้องการพ่นสารเคมีในบ้านหรือชุมชน ขอให้ประสานกับเทศบาลหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ในการดำเนินงาน สำหรับข้อมูล ด้านโรคไข้เลือดออกหรือโรคติดต่ออื่นๆ ที่สำคัญ หรือสถานการณ์โรคอื่นๆ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ Web site ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการและประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสิทธิ์ ปฐวีศรีสุธา)

นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

ร.ก.ในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

โทร ๐๖๒-๒๔๙-๑๕๘๑

# รายงานสถานการณ์ โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง พ.ศ.2566 ประจำสัปดาห์การระบาดที่ 40

## ประเทศไทย

ข้อมูลตั้งแต่ 1 ม.ค. - 2 ต.ค. 66 พบผู้ป่วย 106,548 ราย อัตราป่วย 161.02 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 102 ราย 5 อันดับแรก ได้แก่

1. ตราด 696.65 ต่อแสน ปชก.
2. น่าน 563.75 ต่อแสน ปชก.
3. จันทบุรี 505.64 ต่อแสน ปชก.
4. เชียงราย 488.90 ต่อแสน ปชก.
5. ระยอง 462.43 ต่อแสน ปชก.

## เขตสุขภาพที่ 6

ข้อมูลตั้งแต่ 1 ม.ค. - 2 ต.ค. 66 พบผู้ป่วย 15,983 ราย อัตราป่วย 255.66 ต่อแสน ปชก. เสียชีวิต 21 ราย (ระยอง 6 ราย จันทบุรี 5 ราย ชลบุรี 4 ราย ฉะเชิงเทรา 2 ราย สมุทรปราการ 2 ราย สระแก้ว 1 ราย ตราด 1 ราย)

- อันดับ 1. ตราด 2. จันทบุรี 3. ระยอง 4. ชลบุรี  
5. ปราจีนบุรี 6. สระแก้ว 7. สมุทรปราการ 8. ฉะเชิงเทรา

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง พ.ศ.2566  
เปรียบเทียบ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน  
(ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 7 ต.ค. 66)

| ปี   | ป่วย (ราย) | อัตราป่วย (/100,000 ปชก.) | ตาย (ราย) | อัตราตาย (ร้อยละ) |
|------|------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| 2561 | 1235       | 172.16                    | 1         | 0.08              |
| 2562 | 2157       | 295.71                    | 2         | 0.09              |
| 2563 | 2274       | 307.11                    | 2         | 0.09              |
| 2564 | 145        | 19.40                     | 0         | 0.00              |
| 2565 | 442        | 58.51                     | 1         | 0.23              |
| 2566 | 3376       | 441.31                    | 6         | 0.18              |

## อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก แยกรายอำเภอ จังหวัดระยอง พ.ศ.2566

| อำเภอ      | ป่วยสะสม (ราย) | เสียชีวิต (ราย) | อัตราป่วย | อัตราตาย | CFR% |
|------------|----------------|-----------------|-----------|----------|------|
| ปลวกแดง    | 626            | 1               | 750.67    | 1.20     | 0.16 |
| แกลง       | 791            | 3               | 608.71    | 3.08     | 0.51 |
| เมืองระยอง | 1170           | 1               | 406.59    | 0.35     | 0.09 |
| วังจันทร์  | 105            | 0               | 404.89    | 0.00     | 0.00 |
| นิคมพัฒนา  | 194            | 0               | 306.18    | 0.00     | 0.00 |
| บ้านค่าย   | 212            | 0               | 294.38    | 0.00     | 0.00 |
| เขาชะเมา   | 66             | 0               | 279.31    | 0.00     | 0.00 |
| บ้านฉาง    | 212            | 0               | 268.52    | 0.00     | 0.00 |

## สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 7 ต.ค. 2566

จำนวนป่วย 3,376 ราย  
อัตราป่วย 441.31 ต่อแสน ปชก.  
จำนวนตาย 6 ราย  
อัตราป่วยตายร้อยละ 0.18

เพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ป่วย +94 ราย  
ตาย +1 ราย

จำนวนผู้ป่วย พ.ศ.2566 มากกว่า พ.ศ.2565  
ณ ช่วงเวลาเดียวกัน 7.5 เท่า



เพศหญิง : เพศชาย

1 : 1.14




อาชีพเสี่ยง

รับจ้าง ร้อยละ 37.82

กลุ่มอายุป่วยที่พบมากที่สุด อายุ 6-12 ปี อัตราป่วย 968.91 ต่อแสนฯ ปชก. รองลงมา อายุ 13-18 ปี (922.33 ต่อแสนฯ) และอายุ 19-24 ปี (783.53 ต่อแสนฯ)

การกระจายของโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 37 - 40  
(ระหว่างวันที่ 10 ก.ย. - 7 ต.ค. 66)



พื้นที่ที่พบผู้ป่วย  
ต่อเนื่องมากกว่า 28 วัน

จำนวน 6 อำเภอ 12 ตำบล

- อ.เมืองระยอง ไต๋แก้ง ต.เชิงเนิน ต.เนินพระ ต.ห้วยมา ต.ห้วยโป่ง ต.มาบตาพุด
- อ.แกลง ไต๋แก้ง ต.ทางเกวียน ต.วังหว้า
- อ.นิคมพัฒนา ไต๋แก้ง ต.นิคมพัฒนา
- อ.บ้านฉาง ไต๋แก้ง ต.สำนักท้อน ต.พลา
- อ.วังจันทร์ ไต๋แก้ง ต.ชุมแสง
- อ.เขาชะเมา ไต๋แก้ง ต.น้ำเป็น

## สถานการณ์โรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ พ.ศ. 2565-2566 และมีฐาน 5 ปี จังหวัดระยอง

ปี พ.ศ.2566 เริ่มพบผู้ป่วยรายใหม่ > ปี 2565 ตั้งแต่สัปดาห์แรกของปี 2566 จำนวนผู้ป่วยมากกว่า ปี 2565 ถึง 7.5 เท่า ณ ช่วงเวลาเดียวกัน พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด 380 ราย (ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว 55 ราย)

